

Information pourtour méditerranéen tique *Hyalomma marginatum*

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

LES INSTANCES



Pourtour méditerranéen risque de zoonose de la Fièvre Hémorragique de Crimée-Congo par piqûre du tique *Hyalomma marginatum*. Pour le moment, aucun humain n'a été infecté sur le territoire Français.

Réunion exceptionnelle de la FSSSCT-M

Cette réunion avait pour but de présenter le plan de communication du MASA sur le risque zoonose de la Fièvre Hémorragique de Crimée-Congo. Cette communication sera en direction du grand public, mais également envers les professionnels où le risque de contamination a été identifié. Vous pourrez retrouver ces publications sur le site intranet du MASA.

Le virus de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo se transmet le plus souvent par **la piqûre d'une tique *Hyalomma marginatum*** (attention l'illustration de l'article est une **image** non représentative , vous trouverez **une photo** sur le site de **l'ANSES**, **lien en fin d'article**)

Il peut également se transmettre de façon moins coutumière suite à un contact à risque avec le sang d'un animal infecté ou par les fluides d'une personne infectée.

- Le territoire français touché pour le moment est **restreint et se trouve sur le pourtour méditerranéen de la France (Pyrénées Orientales, Aude, Hérault, Gard, Ardèche, Drôme, Bouches- du-Rhône, Var, Alpes-Maritimes)**. Cependant, la vigilance est de mise car les animaux peuvent être déplacés sur tout le territoire.

Pour le moment, aucun humain n'a été infecté sur le territoire Français.

Les recommandations :

- porter des vêtements clairs (afin de mieux repérer les tiques) et couvrir tout le corps pour les missions dans la nature.
- porter des équipements de protection adaptés lorsque que l'on travaille en contact avec des animaux pouvant être contaminés
- **s'inspecter** au retour de sorties dans la nature
- après avoir été piqué par une tique il faut l'**enlever** le plus rapidement possible à l'aide **d'un tire-tique**.
- prendre en **photo la tique une fois retirée**, en cas de complication, de symptômes, consulter votre médecin. Fièvre hémorragique, difficile à distinguer d'une grippe intestinale (maladie potentiellement mortelle).

Les métiers identifiés à risque au sein du ministère sont les missions dans la nature et les métiers en contact avec des animaux. Les DUERP doivent être mis à jour.

Cet article est une présentation synthétique, nous vous recommandons de lire :

[Lire les recommandations de l'ANSES](#)

[Lire l'article de l'institut pasteur](#)